

# LE PORT DE GANTS

Cathy VANCAUWENBERGHE

Infirmière

Service Universitaire Régional de Maladies Infectieuses et Conseil aux Voyageurs

# POURQUOI REPARLER DES GANTS?

## ■ Constats

- Non usage des gants :
  - Lors des soins du corps du patient (plaies, pansements,...)
  - Lors des prélèvements sanguins et lors des gestes invasifs

Exemple : > à 1 AES/ mois au CISIH

- Usage non adapté des gants :
  - Taille
  - Type
  - Pour quel geste? Stérile ou non stérile

# A QUOI SERT-IL DE PORTER DES GANTS ?

2 intérêts majeurs :

## **LA PROTECTION DU PATIENT**

Protection supplémentaire du lavage de mains.  
Eviter la transmission manuportée :

- d'un germe de la flore bactérienne du soignant,
- d'un germe résistant venant d'un autre patient.

# LA PROTECTION DU SOIGNANT

Se protéger vis-à-vis des agents transmissibles portés par le patient.

En cas de piqûre accidentelle, le port de gants diminue l'innoculum.

# LESQUELS CHOISIR ?

## GANTS NON STERILE

### LATEX ET COTON

Se protéger lors d'activités nécessitant l'emploi de détergents, désinfectants (entretien des locaux).



### VINYL

Utilisation limitée aux soins d'hygiène corporelle (petite toilette).



# GANTS STERILE (LATEX)

Utilisation lors de gestes techniques ou lorsqu'il existe un risque de contact avec les liquides biologiques.

C'est aussi lors de contact : avec des surfaces ou matériel souillés, avec des malades infectés par un germe multirésistant, avec des malades en isolement et lorsque la peau des mains est lésée.

Pour les soins nécessitant une asepsie rigoureuse (hémoculture...)

En chirurgie, au bloc opératoire (recommandation de la double paire de gants à changer toutes les 45 minutes/GERES).



# COMMENT LES PORTER ?

Le port de gants ne dispense pas du lavage de main.

Le lavage de mains reste le meilleur moyen de prévenir les infections manuportées.

Quelques recommandations :

- les ongles courts et propres,
- les mains doivent être dépourvus de bijoux,
- lavage des mains avant, après le port de gants,



# COMMENT LES PORTER ? *(suite)*

- mains sèches avant d'enfiler une paire de gants,
- choix adaptée de la taille des gants ( trop grands, ils laissent passer l'eau et les liquides biologiques; trop petits, ils se déchirent plus rapidement ),
- mettre les gants juste avant le soin et les jeter juste après usage,

**1 soin = 1 paire de gants**

# LA SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE

Une alternative au lavage des mains

Elle remplace le lavage de mains lorsque celles-ci ne sont pas souillées.



Elle est même plus efficace quand à la destruction de la flore bactérienne présente sur les mains.

Il est donc recommandé de l'utiliser et est d'ailleurs présente dans l'ensemble de nos services.

Son utilisation après le retrait de gants talqués, présente cependant un inconfort puisqu'il persiste la présence de talc sur les mains.


Dans ces conditions, un rinçage des mains à l'eau sans savon est possible.

Les gants talqués sont d'ailleurs sujets à disparaître au sein de l'hôpital après épuisement du stock .

# CONCLUSION

- Le port des gants est une étape primordiale parmi les 10 recommandations des précautions universelles
- Le respect de ces recommandations et les trithérapies ont permis de ne plus voir de contamination par le VIH chez le personnel soignant depuis 1997.

# Répartition des AES parmi le personnel soignant (étude dans 155 hôpitaux français en 1998)



Tarantola A. et al. Pratiques de chimioprophylaxie après accident exposant au sang chez les personnels soignants dans 155 hôpitaux français en 1998. BEH 43-1999

# Type d'exposition

(AES déclarés en médecine du travail de 1995 à 1997 dans les hôpitaux de l'interrégion nord)

