

# **Femmes et VIH**

## **La féminisation de l'épidémie**

---

Mardi 23 octobre 2007

**Florence Lot, Caroline Semaille**

Unité VIH/Sida - IST-VHC

Département des Maladies Infectieuses

Institut de Veille Sanitaire



# Les femmes sont vulnérables face au VIH

---

## Une vulnérabilité "biologique"


- Zones de muqueuses susceptibles d'être exposées plus étendues
- Charge virale dans liquide séminal > liquide vaginal
- Micro-déchirures du vagin/rectum par pénétration sexuelle
- Des IST souvent asymptomatiques et non traitées qui augmentent le risque de transmission du VIH

## Une vulnérabilité "socio-économique"

- Difficultés d'accès à l'information et à la prévention
- Difficultés de négociation de la prévention avec les partenaires (voire rapports sexuels forcés)


# 18 millions de femmes vivent avec le VIH dans le monde fin 2006 (48 % de la population séropositive totale)

Estimated number of women and men (15-49) living with HIV/AIDS by region for 2003 (as of 21 June 2004)



## La proportion de femmes augmente progressivement dans le monde

---



Source : ONUSIDA/OMS, 2006, *Personnes vivant avec le VIH*

## Face à la féminisation mondiale, des initiatives se sont développées


---

- Renforcement de la distribution des préservatifs féminins
- Développement des microbicides .... malheureusement pas toujours concluants
- Création de "the global Coalition on Women and AIDS" en 2004



## En Europe de l'Ouest, les femmes sont largement touchées par le VIH

---



**Proportion de femmes parmi  
les nouveaux diagnostics VIH en 2005**

Source : EuroHIV


# Quelle est la situation des femmes en France vis-à-vis du VIH ?

---

La surveillance épidémiologique peut répondre à cette question :


- Les diagnostics de sida depuis 1982
- Les découvertes de séropositivité VIH depuis 2003

# La proportion des femmes augmente parmi les nouveaux cas de sida




Source : InVS, données redressées au 31/12/2006

## Il s'agit principalement de femmes étrangères...



Source : InVS, données redressées au 31/12/2006


## Notamment de pays d'Afrique subsaharienne...



Source : InVS, données redressées au 31/12/2006

Les données de la DO du VIH confortent celles du sida  
Les femmes représentent 36 % des découvertes  
de séropositivité en 2006

---




Source : InVS, données au 31/12/2006 redressées pour les délais de déclaration

Les données de la DO du VIH confortent celles du sida :  
Les femmes Africaines représentent la moitié  
des découvertes de séropositivité chez les femmes en 2006

---

Nationalité autre/inconnue




**N = 1 409**

Source : InVS, données au 31/12/2006 redressées pour les délais de déclaration


Les données de la DO du VIH confortent celles du sida :  
Les femmes Africaines représentent la moitié des  
découvertes de séropositivité chez les femmes

---



Afrique

Cette proportion reflète en partie  
la prévalence dans les pays  
d'origine et les flux migratoires vers  
la France



# Quelles sont les caractéristiques des femmes découvrant leur séropositivité ?


---

	Femmes d'un pays d'Afrique subsaharienne	Femmes françaises
	N = 759	N = 397
Age moyen	32,3 ans	38,4 ans
En activité professionnelle	16 %	46 %
Domicile en Ile-de-France	59 %	31 %
Dépistage pour grossesse	20 %	13 %
Stade clinique de sida	11 %	17 %
Transmission hétérosexuelle	84 %	87 %
Partenaire sexuel stable*	62 %	76 %
Infection $\leq$ 6 mois	9 %	29 %
Infection à sous-type B	25%	67 %

\* Information disponible pour un quart des femmes africaines et la moitié des femmes françaises

Source : InVS, données 2005 au 30/06/2006

## Les découvertes de séropositivité depuis 2003 : le nombre de femmes diminue



Source : InVS, données redressées au 31/12/2006

# Synthèse

## Les Femmes et le VIH

---

- La féminisation de l'épidémie, observée au niveau mondial, semble se stabiliser en France depuis 2002, et dans les autres pays européens

- En France, nombre important de femmes d'Afrique subsaharienne, surreprésentées en Ile-de-France, dépistées rarement dans les mois qui suivent leur contamination, mais rarement aussi au stade sida.

Infections acquises en France → ne pas relâcher les efforts de prévention auprès des femmes africaines

- Presqu'une femme française sur 5 est dépistée au stade sida, trois quarts contaminées par leur partenaire habituel → ne pas cibler le dépistage seulement sur les femmes ayant des partenaires multiples

# Les données épidémiologiques ont permis d'orienter les politiques de prévention

---

## Les campagnes de l'Inpes



**ciblent les femmes africaines  
depuis 2000 ...**

# Les données épidémiologiques ont permis d'orienter les politiques de prévention



... sans oublier l'ensemble des femmes

**LE PRÉSÉRATIF FÉMININ**




**Pour s'informer**

• Sida Info Service: 0 800 800 800  
Appel anonyme, confidentiel et gratuit,  
24h sur 24.  
Site internet: [www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)

• Mouvement français pour le planning familial:  
6061 internet: [www.planning-fam.org](http://www.planning-fam.org)

• Ecoles Sexuelle, Contraception, Avortement:  
0 800 800 800 (Nord de la France)  
appel gratuit,  
0 800 105 105 (Sud de la France)  
appel gratuit.


**Mode d'emploi  
du préservatif  
féminin**



# Découvertes de séropositivité en région Nord-Pas de Calais en 2006

---


Femmes



Hommes

**Total**

Nationalité autre/inconnue



France

Afrique

**Femmes**