

Recommandations générales pour les professionnels

Hygiène des mains

- entre chaque prise en charge de patient,
- sur des mains sans bijou, ni vernis ni faux ongles, ni montre au poignet.

Tenue professionnelle

- adaptée, fermée
- changée au moins quotidiennement
- changée systématiquement en cas de souillure.

Si risque de contact avec du sang et des liquides biologiques

respecter les précautions "standard".

Lors d'un AES (Accident Exposant au Sang)

par piqûre

- laver la plaie à l'eau et au savon
- sécher
- tremper 10 minutes dans un antiseptique (alcool, dakin ou bétadine ®)

par projection sur peau lésée ou muqueuse

- rincer abondamment à l'eau courante (10 minutes)
- désinfecter
 - > Pour la peau (idem piqûre)
 - > Pour les yeux : collyre antiseptique

prise en charge/déclaration

- prendre contact avec le médecin référent (5610 la journée, 4595 les samedis, dimanches et jours fériés)
- ou les urgences (4463)

Recommandations générales pour les véhicules et le matériel

Literie (drap, taie d'oreiller) :

changée entre chaque patient et de préférence à usage unique

Couverture

- à protéger par une housse
- changée quotidiennement
- changée systématiquement en cas de projections.

Entretien du matériel entre deux patients

- porter des gants à usage unique,
- éliminer les déchets et le linge souillé,
- nettoyer le brancard (Cf procédure)
- nettoyer les dispositifs médicaux (Cf procédure)

Bionettoyage quotidien du véhicule

- porter des gants
- éliminer les déchets et le linge souillé
- réaliser l'entretien (Cf procédure)
- tracer les opérations d'entretien



Informations sur la maîtrise du risque infectieux pour le transport sanitaire*

Le transport sanitaire est un des maillons du réseau de soins. Vous allez être amené à prendre en charge des patients qui peuvent présenter un risque infectieux ou inversement des patients fragiles qui ont besoin d'être protégés de l'environnement. Les bactéries se transmettent très facilement d'une personne à l'autre et surtout par les mains. De plus, certaines bactéries peuvent être résistantes aux antibiotiques (BMR) et être à l'origine d'infections plus difficiles à traiter.

UHLIN



4586 / 6091

Précautions "standard"



Précautions à prendre pour tous les patients

1. Désinfection des mains avec un produit hydroalcoolique et/ou lavage des mains (un creux de mains pour un flacon de poche) après le retrait des gants, entre deux patients, après entretien du matériel ou du véhicule.

2. Port de gants : si risque de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient, le linge et le matériel souillé. Les gants doivent être changés entre deux patients.

3. En cas de contact avec du sang et des liquides biologiques :

- après piqûre ou blessure : ne pas faire saigner, lavage et antisepsie au niveau de la plaie.
- après projection sur muqueuse : rinçage abondant.

4. Port de surblouse, masque : si risque de projection de sang ou tout autre produit d'origine humaine.

5. Matériel souillé :

- matériel piquant ou tranchant à usage unique : il doit être évacué dans un container adapté.
- matériel réutilisable : manipuler avec précaution ce matériel souillé par du sang ou tout autre produit d'origine humaine. Il subira un entretien approprié avant réutilisation.

6. Surfaces souillées avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine : nettoyer puis désinfecter avec de l'eau de javel (1 volume de javel pour 9 volumes d'eau).

7. Transport de prélèvements biologiques dans des containers adaptés. **Le linge et le matériel souillés** doivent être évacués dans un emballage étanche et fermé.

Des précautions complémentaires d'hygiène peuvent être nécessaires selon les informations qui vous seront données par les soignants ou le patient. Elles s'ajoutent au strict respect des précautions "standard".

Précautions de type contact



Ex : Infection cutanée, urinaire, digestive à BMR ou autres germes contagieux, parasitose (gale...).

Patient

- plaie recouverte d'un pansement propre et hermétique,
- protection changée en cas de diarrhée ou fuite urinaire.

Brancardier / ambulancier

- gants à usage unique, pour l'installation du patient
- protection de la tenue, pour l'installation du patient
- hygiène des mains après retrait des gants.

Ambulance

respecter l'entretien habituel entre deux patients.

Précautions de type gouttelettes



Ex : Infection trachéale ou sur trachéotomie, infection pulmonaire à BMR, méningite, coqueluche, ...

Patient

- masque de soins,
- protection de la trachéotomie.



Brancardier / ambulancier

si le port de masque est impossible pour le patient mettre un masque de soins.

Ambulance

- respecter l'entretien habituel entre deux patients,
- bionettoyage des parois avec un détergent désinfectant en cas de projection.

Précautions de type air



Ex : Tuberculose pulmonaire, rougeole...

Patient

- masque de soins.



Brancardier / ambulancier

-si le patient ne porte pas de masque de soins en permanence mettre un masque spécifique (protection respiratoire de type FFP2).



Ambulance

- aération avant le bionettoyage avec un détergent désinfectant (ouvrir toutes les portes du véhicule),
- respecter l'entretien habituel entre deux patients.

Précautions de type protecteur



Ex : Patients immunodéprimés, en aplasie, ...

Patient

- masque de soins.

Brancardier / ambulancier

- hygiène des mains avant la prise en charge du patient,
- revêtir une surblouse à usage unique en cas de contact étroit avec le patient.

Ambulance

- bionettoyage systématique du brancard et de la totalité de la cellule **avant** chaque transport,
- draps à usage unique si possible,
- couverture propre,
- fenêtres fermées.